ESTUDIO SCHÄR DE LA CELIAQUÍA Y LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL GLUTEN

1 PRINCIPALES TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL GLUTEN

44,6% ... de la población padece o conoce a alguien que padece algún tipo de trastorno relacionado con el gluten.

450.000 CELÍACOS
1% DE LA POBLACIÓN

SOLO 1 DE CADA 7 ESTÁ **DIAGNOSTICADO**

LA **CELIAQUÍA** AFECTA AL DOBLE DE MUJERES QUE DE HOMBRES

1% INCIDENCIA DE LA CELIAQUÍA **VS** **6%** SENSIBILIDAD AL GLUTEN

Se estima que **2.700.000 personas** podrían ser sensibles al gluten

2 NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL GLUTEN

8 DE CADA 10 **HA OÍDO HABLAR** de algún tipo de trastorno relacionado con el gluten

HA OÍDO HABLAR **SOBRE**

60% CELIAQUÍA

33,6% SENSIBILIDAD AL GLUTEN

34,4% El **dolor de tripa** es el principal síntoma asociado al consumo de gluten.

43,5% Desconoce que la celiaquía es la principal enfermedad relacionada con el gluten.

64,7% Saben lo que es el gluten.

Gluten: Proteína contenida en cereales como el trigo o el centeno

3 INTERES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Se informan a través del "boca-oreja"

Es el primer canal de información a través del cual son conocidos los trastornos relacionados con el gluten **para el 55,5%**

Quieren saber más

Casi la mitad de la población (48,5%) tiene interés en obtener más información sobre la celiaquía y sensibilidad al gluten... **Para el 12,8% ese interés es muy alto**.

Los siguen en los medios

El 40,8% de la población ha visto noticias en los medios sobre la intolerancia al gluten en los últimos 6 meses.

4 RAZONES PARA LA COMPRA Y CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO

Razones para la compra de productos sin gluten en los últimos **6 meses**

32% Por recomendación de familiares o amigos.

32% Por decisión propia.

15% Para intentar mejorar la salud o molestias.

LOS **HOMBRES** COMPRAN MÁS PARA PROBAR Y LAS **MUJERES** MÁS PREOCUPADAS POR SU SALUD

24% **41%** Para probarlos.

23% **7%** Para ver si le ayuda a mejorar.

CONVERSACIÓN CON EL **MÉDICO**

No han hablado con su médico sobre la intolerancia al gluten.

De los que han hablado con su médico, se les recomendó dieta sin gluten.

76,1%

35,3%

Estudio Schär de la celiaquía y los trastornos relacionados con el gluten realizado por Dr.Schär en 2015, sobre la población española mayor de 25 años

Para más información
info.es@drschar.com / www.schaer.com/es / prguerra@webershandwick.com